

# Partitions et entropie

La théorie de l'entropie que l'on va exposer dans ce chapitre fut développée par Kolmogorov et Sinaï à la fin des années 1950. L'entropie d'un processus stationnaire  $(X_p)_{p \in \mathbb{Z}}$  est un nombre réel positif qui permet de mesurer l'imprévisibilité de ce processus : si on connaît tout le passé  $(X_p)_{p < 0}$ , est-il possible de prévoir à *coup sûr* la valeur de  $X_0$  ? Si non, combien la connaissance de ce passé apporte-t-elle d'information pour la prévision de  $X_0$  ?

L'entropie permet de définir un *invariant* des systèmes dynamiques, c'est-à-dire une quantité liée au système qui ne change pas lorsqu'on considère un autre système isomorphe. Elle permet donc de distinguer des systèmes dont on pourrait *a priori* imaginer qu'ils soient isomorphes, comme par exemple les décalages de Bernoulli  $B(1/2, 1/2)$  et  $B(1/3, 1/3, 1/3)$ .

Les processus stationnaires considérés ici sont tous supposés à valeurs dans un alphabet fini ou dénombrable, et définis sur un système dynamique  $(X, \mathcal{A}, \mu, T)$  : leurs coordonnées sont toutes données par

$$\forall p \in \mathbb{Z}, \quad X_p = X_0 \circ T^p.$$

Le processus est donc complètement déterminé par la donnée de  $T$  et de  $X_0$  ; la variable  $X_0$  est elle-même définie par une partition finie ou dénombrable de  $X$  dont les atomes sont indexés par l'alphabet dans lequel le processus prend ses valeurs. On représente donc un processus sous la forme d'un couple  $(\mathcal{P}, T)$ , où  $\mathcal{P}$  est une partition de l'espace de Lebesgue sur lequel agit l'automorphisme  $T$ .

## 1 Partitions d'un espace de Lebesgue

On désigne toujours par  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  un espace de Lebesgue, qui est généralement supposé sans atome (donc isomorphe à l'intervalle  $[0, 1]$  muni de la mesure de Lebesgue).

**Définition 1.1** *On appelle partition de  $X$  une application  $\mathcal{P}$  mesurable de  $X$  dans un ensemble fini  $I$ . (On dit alors que  $\mathcal{P}$  est indexée par  $I$ .)*

Si  $\mathcal{P} : X \rightarrow I$  est une partition (au sens défini ci-dessus), alors  $\mathcal{P}$  définit une partition (au sens usuel) de  $X$  en un nombre fini de parties mesurables, qui sont les  $P_i$ ,  $i \in I$  donnés par

$$\forall i \in I, \quad P_i \stackrel{\text{déf}}{=} \mathcal{P}^{-1}(\{i\}).$$

Les  $P_i$  sont appelés les *atomes de  $\mathcal{P}$* . Notons cependant une petite nuance par rapport à la définition usuelle d'une partition : ici, on n'interdit pas que certains  $P_i$  soient éventuellement vides.

On appelle *distribution* de la partition  $\mathcal{P} = \{P_i, i \in I\}$  le vecteur  $(\mu(P_i))_{i \in I} \in [0, 1]^I$ , que l'on note  $\text{dist } \mathcal{P}$ . Cette distribution n'est pas autre chose, en fait, que la probabilité sur  $I$  image de  $\mu$  par  $\mathcal{P}$ .

### 1.1 Distance entre deux partitions

Si  $\mathcal{P} = \{P_i, i \in I\}$  et  $\mathcal{Q} = \{Q_i, i \in I\}$  sont deux partitions indexées par le même ensemble  $I$ , on définit la *distance entre  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$* , notée  $|\mathcal{P} - \mathcal{Q}|$ , par

$$\begin{aligned} |\mathcal{P} - \mathcal{Q}| &\stackrel{\text{déf}}{=} \mu\left(\{x \in X / \mathcal{P}(x) \neq \mathcal{Q}(x)\}\right) \\ &= \sum_{i \in I} \mu(P_i \setminus Q_i) \\ &= \sum_{i \in I} \mu(Q_i \setminus P_i) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i \in I} \mu(P_i \Delta Q_i). \end{aligned}$$

On identifie toujours deux partitions  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  telles que  $|\mathcal{P} - \mathcal{Q}| = 0$ . Alors, l'ensemble d'index  $I$  étant fixé, l'ensemble des partitions de  $X$  dans  $I$  muni de cette distance est un espace métrique complet (exercice...).

### 1.2 Sup de partitions

Si  $\mathcal{P} : X \rightarrow I$  et  $\mathcal{Q} : X \rightarrow J$  sont deux partitions de  $X$ , on note  $\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$  la partition de  $X$  indexée par  $I \times J$  définie par

$$\forall x \in X, \quad \mathcal{P} \vee \mathcal{Q}(x) \stackrel{\text{déf}}{=} \left( \mathcal{P}(x), \mathcal{Q}(x) \right).$$

Ses atomes sont les  $P_i \cap Q_j$ ,  $i \in I, j \in J$ . De même, si  $(\mathcal{P}_k)_{1 \leq k \leq n}$  est une famille finie de partitions, où  $\mathcal{P}_k$  est indexée par  $I_k$ , la partition  $\bigvee_{k=1}^n \mathcal{P}_k$  est la partition indexée par  $I_1 \times \cdots \times I_n$ , définie par

$$\bigvee_{k=1}^n \mathcal{P}_k(x) \stackrel{\text{déf}}{=} \left( \mathcal{P}_1(x), \dots, \mathcal{P}_n(x) \right).$$

Par contre, si on considère une famille infinie dénombrable de partitions, par exemple  $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ , alors la notation  $\bigvee_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{P}_k$  désigne cette fois la *tribu* engendrée par la famille  $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ .

### 1.3 Ordre sur les partitions

On dit que la partition  $\bar{\mathcal{P}} : X \rightarrow \bar{I}$  est *plus fine* que la partition  $\mathcal{P} : X \rightarrow I$  si chaque atome de  $\mathcal{P}$  est une réunion d'atomes de  $\bar{\mathcal{P}}$ . On note dans ce cas  $\mathcal{P} \subset \bar{\mathcal{P}}$ .

Il n'est pas difficile de vérifier l'équivalence entre  $\mathcal{P} \subset \bar{\mathcal{P}}$ , et chacune des deux propriétés suivantes.

1. Il existe une application  $h : \bar{I} \rightarrow I$ , telle que  $\mathcal{P} = h \circ \bar{\mathcal{P}}$ . (i.e. si on connaît  $\bar{\mathcal{P}}(x)$ , alors on connaît aussi  $\mathcal{P}(x)$ .)
2. Il existe une troisième partition  $\mathcal{Q}$ , indexée par un ensemble  $J$ , telle que les atomes non négligeables de  $\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$  coïncident avec les atomes non négligeables de  $\bar{\mathcal{P}}$ .

Soient  $\mathcal{P} : X \rightarrow I$  et  $\mathcal{Q} : X \rightarrow J$  deux partitions, et  $\varepsilon > 0$ . On dit que  $\mathcal{Q}$  est  $\varepsilon$ -mesurable par rapport à  $\mathcal{P}$ , et on note  $\mathcal{Q} \stackrel{\varepsilon}{\subset} \mathcal{P}$  si il existe une partition  $\bar{\mathcal{Q}} : X \rightarrow J$ , moins fine que  $\mathcal{Q}$ , telle que  $|\mathcal{Q} - \bar{\mathcal{Q}}| < \varepsilon$ .

## 1.4 Restriction d'une partition

Si  $A$  est une partie mesurable non négligeable de  $X$ , et si  $\mathcal{P}$  est une partition de  $X$  indexée par un ensemble  $I$ , la *restriction* de  $\mathcal{P}$  à  $A$ , notée  $\mathcal{P}|_A$  est vue comme une partition de l'espace de Lebesgue  $(A, \mathcal{A}_A, \mu_A)$ . Sa distribution est

$$\text{dist } \mathcal{P}|_A = \left( \frac{\mu(P_i \cap A)}{\mu(A)}, i \in I \right).$$

## 1.5 Partitions indépendantes

Soient deux partitions  $\mathcal{P} : X \rightarrow I$  et  $\mathcal{Q} : X \rightarrow J$ . Elles sont dites *indépendantes* si pour tout  $i \in I$  et tout  $j \in J$ ,  $\mu(P_i \cap Q_j) = \mu(P_i)\mu(Q_j)$ . Une formulation équivalente consiste à dire que pour tout atome  $Q_j$  non négligeable de  $\mathcal{Q}$ ,  $\text{dist } \mathcal{P}|_{Q_j} = \text{dist } \mathcal{P}$ .

# 2 Entropie sans transformation

Dans tout ce qui suit, le logarithme est pris en base 2, ce qui n'a en fait aucune importance (la base utilisée ne se voit que dans des calculs explicites d'entropie, ou dans une certaine formulation du théorème de Shannon-McMillan).

On convient que  $0 \log 0 \stackrel{\text{déf}}{=} 0$ , ce qui revient à prolonger par continuité la fonction  $x \mapsto x \log x$  en 0.

## 2.1 Entropie d'une partition

**Définition 2.1** Soit  $\mathcal{P}$  une partition de  $X$ , indexée par  $I$ . On appelle entropie de la partition  $\mathcal{P}$  le nombre réel noté  $E(\mathcal{P})$  défini par

$$E(\mathcal{P}) \stackrel{\text{déf}}{=} - \sum_{i \in I} \mu(P_i) \log \mu(P_i).$$


Notons que l'entropie de  $\mathcal{P}$  ne dépend en fait que de la distribution de la partition  $\mathcal{P}$ . Les propriétés de la fonction  $g : x \mapsto -x \log x$ , qui apparaît dans la définition précédente, sont essentielles dans la suite. Il faut notamment remarquer que  $g$  est continue, positive et strictement concave sur  $[0, 1]$ , avec  $g(x) = 0$  seulement si  $x$  vaut 0 ou 1. Une première conséquence est que l'entropie de  $\mathcal{P}$  est toujours positive, et qu'elle est nulle uniquement dans le cas où  $\mathcal{P}$  est triviale (c'est-à-dire lorsque  $\mathcal{P}$  comporte un atome de mesure 1).

En fait, l'entropie d'une partition peut s'interpréter comme un nombre qui mesure la difficulté de prévoir dans quel atome de la partition tombe un point  $x$  pris "au hasard" dans  $X$  (avec la loi de probabilité  $\mu$ ). Cette difficulté est *a priori* maximum si tous les atomes de  $\mathcal{P}$  sont équiprobables (le nombre d'atomes étant fixé); la proposition qui suit confirme cette idée intuitive.

**Proposition 2.2** Si on fixe le nombre d'atomes  $k$  de  $\mathcal{P}$ , le maximum de l'entropie est atteint lorsque tous les  $P_i$  ont la même mesure; il vaut alors  $\log k$ .

**Preuve** — Il s'agit de déterminer

$$m(k) \stackrel{\text{déf}}{=} \max_{(p_1, \dots, p_k) \in S_k} \sum_{i=1}^k g(p_i),$$

FIG. 1 – Graphe de  $g$ 

où  $S_k$  est l'ensemble compact constitué des  $k$ -uplets de réels positifs qui vérifient  $\sum_{i=1}^k p_i = 1$ . Soit  $(p_1, \dots, p_k)$  un point de  $S_k$  où ce maximum est atteint, et supposons par l'absurde  $p_1 < p_2$ . Comme  $g$  est strictement concave, on a

$$\frac{g(p_1) + g(p_2)}{2} < g\left(\frac{p_1 + p_2}{2}\right).$$

Posons alors  $p'_1 = p'_2 \stackrel{\text{déf}}{=} (p_1 + p_2)/2$ ,  $p'_3 \stackrel{\text{déf}}{=} p_3, \dots, p'_k \stackrel{\text{déf}}{=} p_k$ . Alors  $(p'_1, \dots, p'_k) \in S_k$ , et

$$\sum_{i=1}^k g(p'_i) > \sum_{i=1}^k g(p_i),$$

ce qui est impossible par choix de  $(p_1, \dots, p_k)$ . On a donc finalement  $p_1 = \dots = p_k = 1/k$ , et

$$m_k = -\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \log(1/k) = \log k.$$

□

**Exercice 2.1** Montrer que, étant donné  $\varepsilon > 0$ , on peut trouver  $\delta > 0$  tel que, si  $\mathcal{P}$  est une partition de  $X$ ,

$$E(\mathcal{P}) < \delta \implies \mathcal{P} \text{ a un atome de mesure supérieure à } 1 - \varepsilon.$$

Inversement, soit  $k$  un entier naturel, et  $\varepsilon > 0$ . Montrer qu'il existe  $\delta > 0$  tel que, pour toute partition  $\mathcal{P}$  comportant  $k$  atomes,

$$\mathcal{P} \text{ a un atome de mesure supérieure à } 1 - \varepsilon \implies E(\mathcal{P}) < \varepsilon.$$

Pourquoi est-ce important de se limiter à des partitions ne comportant qu'un nombre borné d'atomes ?

## 2.2 Entropie conditionnelle

**Définition 2.3** Soient  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  deux partitions de  $X$ , indexées respectivement par  $I$  et  $J$ . On appelle entropie conditionnelle de  $\mathcal{P}$  sachant  $\mathcal{Q}$  le nombre réel, noté  $E(\mathcal{P}|\mathcal{Q})$ , défini par

$$E(\mathcal{P}|\mathcal{Q}) \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{j \in J} \mu(Q_j) E(\mathcal{P}|_{Q_j}).$$

Cette fois, on interprète l'entropie conditionnelle de  $\mathcal{P}$  sachant  $\mathcal{Q}$  comme la mesure de la difficulté de prévoir  $\mathcal{P}(x)$  lorsque l'on connaît déjà  $\mathcal{Q}(x)$  : si on sait que  $\mathcal{Q}(x) = j$ , on mesure cette imprévisibilité par  $E(\mathcal{P}|_{Q_j})$ , puis on fait la moyenne sur tous les atomes  $Q_j$  de  $\mathcal{Q}$ . Clairement, plus on connaît de choses sur  $x$ , moins il doit être difficile de deviner  $\mathcal{P}(x)$ . Aussi, en gardant en tête cette interprétation, les résultats de la proposition suivante ne sont pas surprenants.

**Proposition 2.4** On a toujours  $0 \leq E(\mathcal{P}|\mathcal{Q}) \leq E(\mathcal{P})$ , avec

$$\begin{aligned} E(\mathcal{P}|\mathcal{Q}) = 0 &\iff \mathcal{Q} \text{ est plus fine que } \mathcal{P}, \\ E(\mathcal{P}|\mathcal{Q}) = E(\mathcal{P}) &\iff \mathcal{P} \text{ et } \mathcal{Q} \text{ sont indépendantes.} \end{aligned}$$

**Preuve** — Puisque l'entropie d'une partition est toujours positive, on a  $\forall j, E(\mathcal{P}|_{Q_j}) \geq 0$ , et donc  $E(\mathcal{P}|\mathcal{Q}) \geq 0$ , avec égalité si et seulement si pour tout atome  $Q_j$  (non négligeable), la partition  $\mathcal{P}|_{Q_j}$  est triviale, c'est-à-dire lorsque  $\mathcal{Q}$  est plus fine que  $\mathcal{P}$ . Puis, en utilisant la stricte concavité de  $g$ , on obtient

$$\begin{aligned} E(\mathcal{P}|\mathcal{Q}) &= \sum_{j \in J} \mu(Q_j) \sum_{i \in I} g(\mu_{Q_j}(P_i)) \\ &= \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \mu(Q_j) g(\mu_{Q_j}(P_i)) \\ &\leq \sum_{i \in I} g\left(\sum_{j \in J} \mu(Q_j) \mu_{Q_j}(P_i)\right) \\ &= \sum_{i \in I} g\left(\sum_{j \in J} \mu(P_i \cap Q_j)\right) \\ &= \sum_{i \in I} g(\mu(P_i)) = E(\mathcal{P}), \end{aligned}$$

où l'inégalité est une égalité si et seulement si pour tout  $i$ ,  $\mu_{Q_j}(P_i)$  ne dépend pas de  $j$ , c'est-à-dire si  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  sont indépendantes. (*Remarque* : dans tous les calculs effectués, on se restreint implicitement aux atomes non négligeables des partitions.) □

**Proposition 2.5** Soient  $\mathcal{P}$ ,  $\mathcal{Q}$  et  $\bar{\mathcal{Q}}$  trois partitions de  $X$ , indexées par  $I$ ,  $J$  et  $\bar{J}$  respectivement. On a les égalités et inégalités suivantes.

$$E(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) = E(\mathcal{Q}) + E(\mathcal{P}|\mathcal{Q}) \leq E(\mathcal{P}) + E(\mathcal{Q}), \quad (1)$$

$$\text{et } E(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}|\bar{\mathcal{Q}}) = E(\mathcal{Q}|\bar{\mathcal{Q}}) + E(\mathcal{P}|\mathcal{Q} \vee \bar{\mathcal{Q}}) \leq E(\mathcal{P}|\bar{\mathcal{Q}}) + E(\mathcal{Q}|\bar{\mathcal{Q}}). \quad (2)$$

**Preuve** —

$$\begin{aligned}
E(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) &= - \sum_{i,j} \mu(P_i \cap Q_j) \log \mu(P_i \cap Q_j) \\
&= - \sum_{j \in J} \mu(Q_j) \sum_{i \in I} \mu_{Q_j}(P_i) \log \mu(P_i \cap Q_j) \\
&= - \sum_{j \in J} \mu(Q_j) \sum_{i \in I} \mu_{Q_j}(P_i) \log \mu_{Q_j}(P_i) \\
&\quad - \sum_{j \in J} \mu(Q_j) \log \mu(Q_j) \sum_{i \in I} \mu_{Q_j}(P_i) \\
&= E(\mathcal{P}|\mathcal{Q}) + E(\mathcal{Q}).
\end{aligned}$$

Comme  $E(\mathcal{P}|\mathcal{Q}) \leq E(\mathcal{P})$ , on a bien

$$E(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) \leq E(\mathcal{P}) + E(\mathcal{Q}).$$

Puis, en conditionnant par rapport à la troisième partition  $\bar{\mathcal{Q}}$ , on peut écrire

$$E(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}|\bar{\mathcal{Q}}) = \sum_{j \in \bar{J}} \mu(\bar{Q}_j) E\left((\mathcal{P} \vee \mathcal{Q})|_{\bar{Q}_j}\right).$$

Comme  $(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q})|_{\bar{Q}_j} = \mathcal{P}|_{\bar{Q}_j} \vee \mathcal{Q}|_{\bar{Q}_j}$ , en effectuant le calcul précédent dans chaque atome  $\bar{Q}_j$ , on obtient

$$\begin{aligned}
E(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}|\bar{\mathcal{Q}}) &= \sum_{j \in \bar{J}} \mu(\bar{Q}_j) \left( E\left(\mathcal{Q}|_{\bar{Q}_j}\right) + E\left(\mathcal{P}|_{\bar{Q}_j} \mid \mathcal{Q}|_{\bar{Q}_j}\right) \right) \\
&= E(\mathcal{Q}|\bar{\mathcal{Q}}) + E(\mathcal{P}|\mathcal{Q} \vee \bar{\mathcal{Q}}) \\
&\leq \sum_{j \in \bar{J}} \mu(\bar{Q}_j) \left( E\left(\mathcal{Q}|_{\bar{Q}_j}\right) + E\left(\mathcal{P}|_{\bar{Q}_j}\right) \right) \\
&= E(\mathcal{Q}|\bar{\mathcal{Q}}) + E(\mathcal{P}|\bar{\mathcal{Q}}).
\end{aligned}$$

□

**Proposition 2.6 (Monotonie de l'entropie)** *Si  $\bar{\mathcal{Q}}$  est plus fine que  $\mathcal{Q}$ , on a*

$$\begin{aligned}
E(\bar{\mathcal{Q}}) &\geq E(\mathcal{Q}), \\
E(\bar{\mathcal{Q}}|\mathcal{P}) &\geq E(\mathcal{Q}|\mathcal{P}), \\
\text{et } E(\mathcal{P}|\bar{\mathcal{Q}}) &\leq E(\mathcal{P}|\mathcal{Q}).
\end{aligned}$$

**Preuve** — Comme  $\bar{\mathcal{Q}}$  est plus fine que  $\mathcal{Q}$ , on a

$$E(\bar{\mathcal{Q}}) = E(\mathcal{Q} \vee \bar{\mathcal{Q}}) = E(\mathcal{Q}) + E(\bar{\mathcal{Q}}|\mathcal{Q}) \geq E(\mathcal{Q}).$$

La seconde inégalité se montre de la même manière, en utilisant (2). Enfin, on a

$$E(\mathcal{P}|\bar{\mathcal{Q}}) = E(\mathcal{P}|\mathcal{Q} \vee \bar{\mathcal{Q}}) \leq E(\mathcal{P}|\mathcal{Q}),$$

grâce à l'inégalité dans (2), en inversant les rôles de  $\mathcal{Q}$  et  $\bar{\mathcal{Q}}$ . □

Les résultats à prouver dans les deux exercices qui suivent seront utilisés dans la suite.

**Exercice 2.2** Soient  $\mathcal{P}$ ,  $\mathcal{Q}$  et  $\mathcal{R}$  trois partitions de  $X$ . Prouver “l’inégalité triangulaire”

$$E(\mathcal{P}|\mathcal{Q}) \leq E(\mathcal{P}|\mathcal{R}) + E(\mathcal{R}|\mathcal{Q}).$$

**Exercice 2.3** Montrer que, étant donné  $\varepsilon > 0$ , on peut trouver  $\delta > 0$  tel que, si  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  sont deux partitions de  $X$ ,

$$E(\mathcal{P}|\mathcal{Q}) < \delta \implies \mathcal{P} \stackrel{\varepsilon}{\subset} \mathcal{Q}.$$

Inversement, soit  $k$  un entier naturel, et  $\varepsilon > 0$ . Montrer qu’il existe  $\delta > 0$  tel que, pour toute partition  $\mathcal{P}$  comportant  $k$  atomes, et toute partition  $\mathcal{Q}$ ,

$$\mathcal{P} \stackrel{\delta}{\subset} \mathcal{Q} \implies E(\mathcal{P}|\mathcal{Q}) < \varepsilon.$$

### 2.3 Entropie conditionnelle sachant une sous-tribu

Soit  $(\mathcal{P}_k)_{k \geq 1}$  une suite de partitions, et  $\mathcal{B} \stackrel{\text{déf}}{=} \bigvee_{k \geq 1} \mathcal{P}_k$  la tribu engendrée par ces partitions. Pour une partition  $\mathcal{P}$  quelconque, les propriétés de monotonie de l’entropie conditionnelle assurent que la suite  $E(\mathcal{P}|\bigvee_{k=1}^n \mathcal{P}_k)$ ,  $n \geq 1$  est décroissante. Comme elle est positive, elle admet une limite, que l’on aimerait appeler *entropie conditionnelle de  $\mathcal{P}$  sachant la sous-tribu  $\mathcal{B}$* . Mais, pour que ceci ait un sens, il faut auparavant vérifier que la limite ne dépend pas de la suite  $(\mathcal{P}_k)_{k \geq 1}$  choisie pour engendrer  $\mathcal{B}$ . Soit donc  $(\mathcal{P}'_k)_{k \geq 1}$  une autre suite de partitions engendrant  $\mathcal{B}$ . Posons

$$l \stackrel{\text{déf}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} E\left(\mathcal{P} \left| \bigvee_{k=1}^n \mathcal{P}_k \right.\right), \text{ et } l' \stackrel{\text{déf}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} E\left(\mathcal{P} \left| \bigvee_{k=1}^n \mathcal{P}'_k \right.\right).$$

Soit  $\varepsilon > 0$ , et  $n$  assez grand pour que

$$E\left(\mathcal{P} \left| \bigvee_{k=1}^n \mathcal{P}_k \right.\right) < l + \varepsilon.$$

Grâce à l’exercice 2.3, on peut ensuite trouver  $\delta > 0$  tel que, pour une partition  $\mathcal{Q}$  de  $X$  indexée par le même ensemble que  $\bigvee_{k=1}^n \mathcal{P}_k$ ,

$$\left| \bigvee_{k=1}^n \mathcal{P}_k - \mathcal{Q} \right| < \delta \implies E\left(\bigvee_{k=1}^n \mathcal{P}_k \left| \mathcal{Q} \right.\right) < \varepsilon.$$

Puisque les partitions  $\mathcal{P}_k$  sont mesurables par rapport à la tribu engendrée par les  $\mathcal{P}'_k$ , on peut alors trouver  $N \geq 1$  tel que

$$\bigvee_{k=1}^n \mathcal{P}_k \stackrel{\delta}{\subset} \bigvee_{k=1}^N \mathcal{P}'_k,$$

et on a alors en utilisant le résultat de l’exercice 2.2

$$E\left(\mathcal{P} \left| \bigvee_{k=1}^N \mathcal{P}'_k \right.\right) \leq E\left(\mathcal{P} \left| \bigvee_{k=1}^n \mathcal{P}_k \right.\right) + E\left(\bigvee_{k=1}^n \mathcal{P}_k \left| \bigvee_{k=1}^N \mathcal{P}'_k \right.\right) < l + 2\varepsilon.$$

Comme  $\varepsilon$  est arbitraire, on en déduit que  $l' \leq l$ . (Notons que jusqu’ici, on n’a utilisé que l’inclusion  $\bigvee_{k \geq 1} \mathcal{P}'_k \subset \bigvee_{k \geq 1} \mathcal{P}_k$ .) Avec l’inclusion inverse, on montre de même que  $l \leq l'$ , d’où l’égalité des deux limites. On peut donc maintenant définir de façon cohérente l’entropie de  $\mathcal{P}$  sachant une sous-tribu.

**Définition 2.7** Soit  $\mathcal{P}$  une partition de  $X$ , et  $\mathcal{B}$  une sous-tribu de  $\mathcal{A}$ . On appelle entropie conditionnelle de  $\mathcal{P}$  sachant la sous-tribu  $\mathcal{B}$  le nombre réel positif noté  $E(\mathcal{P}|\mathcal{B})$  défini par

$$E(\mathcal{P}|\mathcal{B}) \stackrel{\text{déf}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} E \left( \mathcal{P} \left| \bigvee_{k=1}^n \mathcal{P}_k \right. \right),$$

où  $(\mathcal{P}_k)_{k \geq 1}$  est une suite de partitions engendrant  $\mathcal{B}$ .

On a des résultats de monotonie analogues à ceux vus dans la proposition 2.6.

**Proposition 2.8** Si  $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}'$ , alors  $E(\mathcal{P}|\mathcal{B}) \geq E(\mathcal{P}|\mathcal{B}')$ , et si  $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}$ , alors  $E(\mathcal{P}|\mathcal{B}) \geq E(\mathcal{Q}|\mathcal{B})$ .

On peut également caractériser la mesurabilité par rapport à une sous-tribu par l'entropie conditionnelle sachant cette sous-tribu.

**Proposition 2.9** Soit  $\mathcal{P}$  une partition de  $X$ , et  $\mathcal{B}$  une sous-tribu engendrée par une suite de partitions  $(\mathcal{P}_k)_{k \geq 1}$ . Les trois propriétés suivantes sont équivalentes.

1.  $\mathcal{P}$  est  $\mathcal{B}$ -mesurable.
2. Pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $n$  tel que  $\mathcal{P} \overset{\varepsilon}{\subset} \bigvee_{k=1}^n \mathcal{P}_k$ .
3.  $E(\mathcal{P}|\mathcal{B}) = 0$ .

La preuve est laissée en exercice...

### 3 Entropie avec transformation

Jusqu'ici, la transformation  $T$  de  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  n'a encore joué aucun rôle, mais tout ce qui vient d'être exposé va maintenant servir pour définir l'entropie d'un processus  $(\mathcal{P}, T)$ . Pour tout entier  $k \in \mathbb{Z}$ , on note  $T^{-k}\mathcal{P}$  la partition, indexée aussi par  $I$ , et dont les atomes sont les  $T^{-k}P_i$ ,  $i \in I$ ; c'est donc la partition  $\mathcal{P} \circ T^k$ .

#### 3.1 Entropie d'un processus $(\mathcal{P}, T)$

Étant donné le processus  $(\mathcal{P}, T)$ , puisque la suite de partitions  $\bigvee_{k=1}^n T^k \mathcal{P}$  devient de plus en plus fine quand  $n$  grandit, la proposition 2.6 prouve que la suite

$$\left( E \left( \mathcal{P} \left| \bigvee_1^n T^k \mathcal{P} \right. \right) \right)_{n \geq 1}$$

est décroissante (et positive!) : sa limite est par définition l'entropie du processus  $(\mathcal{P}, T)$ , notée  $E(\mathcal{P}, T)$ . L'entropie du processus  $(\mathcal{P}, T)$  est donc l'entropie de  $\mathcal{P}$  sachant le passé de  $\mathcal{P}$ , où le passé de  $\mathcal{P}$  est la sous-tribu engendrée par les partitions  $T^k \mathcal{P}$ ,  $k > 0$  (qui correspondent aux coordonnées  $X_p$ ,  $p < 0$ ).

**Proposition 3.1** On a aussi

$$E(\mathcal{P}, T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} E \left( \bigvee_0^{n-1} T^k \mathcal{P} \right).$$

**Preuve** — En appliquant  $(n - 1)$  fois les égalités de la proposition 2.5, on obtient pour tout  $n \geq 1$

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} E \left( \bigvee_0^{n-1} T^k \mathcal{P} \right) &= \frac{1}{n} \left( E \left( \mathcal{P} \left| \bigvee_1^{n-1} T^k \mathcal{P} \right. \right) + E \left( T \mathcal{P} \left| \bigvee_2^{n-1} T^k \mathcal{P} \right. \right) \right. \\ &\quad \left. + \dots + E(T^{n-1} \mathcal{P}) \right) \\ &= \frac{1}{n} \left( E \left( \mathcal{P} \left| \bigvee_1^{n-1} T^k \mathcal{P} \right. \right) + E \left( \mathcal{P} \left| \bigvee_1^{n-2} T^k \mathcal{P} \right. \right) \right. \\ &\quad \left. + \dots + E(\mathcal{P}) \right), \end{aligned}$$

et en appliquant le théorème de convergence de Cesàro, on obtient

$$\frac{1}{n} E \left( \bigvee_0^{n-1} T^k \mathcal{P} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E(\mathcal{P}, T) = \lim_{n \rightarrow \infty} E \left( \mathcal{P} \left| \bigvee_1^{n-1} T^k \mathcal{P} \right. \right).$$

□

**Proposition 3.2** *On a toujours  $E(\mathcal{P}, T) \leq E(\mathcal{P})$ , avec égalité si et seulement si les partitions  $T^k \mathcal{P}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , sont indépendantes.*

**Preuve** — D'après la proposition 2.4, on a pour tout  $n$

$$E \left( \mathcal{P} \left| \bigvee_1^n T^k \mathcal{P} \right. \right) \leq E(\mathcal{P}),$$

d'où par passage à la limite,  $E(\mathcal{P}, T) \leq E(\mathcal{P})$ . De plus, comme  $E \left( \mathcal{P} \left| \bigvee_1^{n-1} T^k \mathcal{P} \right. \right)$  décroît, on a l'égalité à la limite si et seulement si pour tout  $n$ ,

$$E \left( \mathcal{P} \left| \bigvee_1^n T^k \mathcal{P} \right. \right) = E(\mathcal{P}),$$

c'est-à-dire si pour tout  $n$ ,  $\mathcal{P}$  est indépendante de  $\bigvee_1^n T^k \mathcal{P}$ .

□

**Proposition 3.3** *Soient  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  deux partitions de  $X$ . On a*

$$E(\mathcal{P}, T) \leq E(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}, T) \leq E(\mathcal{P}, T) + E(\mathcal{Q}, T).$$

*En particulier, si  $\mathcal{Q}$  est plus fine que  $\mathcal{P}$ , alors  $E(\mathcal{Q}, T) \geq E(\mathcal{P}, T)$ .*

**Preuve** — Utiliser les propositions 2.5 et 3.1.

□

**Proposition 3.4 (Continuité de  $\mathcal{P} \mapsto E(\mathcal{P}, T)$ )** Soient  $k \geq 1$  et  $\varepsilon > 0$  fixés. Alors il existe  $\delta > 0$  tel que, si  $\mathcal{P}$  et  $\bar{\mathcal{P}}$  ont  $k$  atomes et vérifient  $|\mathcal{P} - \bar{\mathcal{P}}| < \delta$ , alors  $|E(\mathcal{P}, T) - E(\bar{\mathcal{P}}, T)| < \varepsilon$ .

**Preuve** — Comme la fonction  $g$  utilisée pour la définition de l'entropie est continue sur  $[0, 1]$ , on peut prendre  $\delta > 0$  tel que

$$\begin{aligned} 0 \leq x < \delta &\implies g(x) < \varepsilon/(k^2), \\ \text{et } 0 \leq 1 - x < \delta &\implies g(x) < \varepsilon/(k^2). \end{aligned}$$

Soient maintenant  $\mathcal{P}$  et  $\bar{\mathcal{P}}$  deux partitions de  $X$ , indexées par un ensemble  $I$  comportant  $k$  éléments. On construit alors une partition  $\mathcal{Q}$  de  $X$  en posant  $\mathcal{Q}(x) \stackrel{\text{déf}}{=} 0$  si  $\mathcal{P}(x) = \bar{\mathcal{P}}(x)$ , et  $\mathcal{Q}(x) \stackrel{\text{déf}}{=} (i, j)$  si  $\mathcal{P}(x) = i \neq \bar{\mathcal{P}}(x) = j$ . Si  $|\mathcal{P} - \bar{\mathcal{P}}| < \delta$ , on a

$$E(\mathcal{Q}) = g\left(\mu\left(\bigcup_{i \in I} P_i \cap \bar{P}_i\right)\right) + \sum_{i \neq j} g(\mu(P_i \cap \bar{P}_j)) < \varepsilon.$$

De plus, la partition  $\mathcal{Q}$  est construite de telle sorte que les atomes de  $\mathcal{P} \vee \bar{\mathcal{P}}$  sont les mêmes que ceux de  $\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$ . On a alors

$$\begin{aligned} E(\mathcal{P}, T) &\leq E(\mathcal{P} \vee \bar{\mathcal{P}}, T) = E(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}, T) \\ &\leq E(\mathcal{P}, T) + E(\mathcal{Q}, T) \\ &\leq E(\mathcal{P}, T) + \varepsilon \\ &< E(\mathcal{P}, T) + \varepsilon, \end{aligned}$$

d'où

$$E(\mathcal{P} \vee \bar{\mathcal{P}}, T) - \varepsilon < E(\mathcal{P}, T) \leq E(\mathcal{P} \vee \bar{\mathcal{P}}, T).$$

On obtient le même résultat en remplaçant  $\mathcal{P}$  par  $\bar{\mathcal{P}}$ , ce qui donne finalement

$$|E(\mathcal{P}, T) - E(\bar{\mathcal{P}}, T)| < \varepsilon.$$

□

**Proposition 3.5** Soit  $\mathcal{P}$  une partition de  $X$ ,  $K$  un entier naturel, et soit  $\mathcal{Q} \stackrel{\text{déf}}{=} \bigvee_{i=-K}^K T^i \mathcal{P}$ . Alors

$$E(\mathcal{Q}, T) = E(\mathcal{P}, T).$$

**Preuve** — En utilisant la proposition 3.1, on a

$$E(\mathcal{Q}, T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} E\left(\bigvee_0^{n-1} T^k \mathcal{Q}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} E\left(\bigvee_{-K}^{K+n-1} T^k \mathcal{P}\right) = E(\mathcal{P}, T).$$

□

### 3.2 Entropie de $T$

Ayant défini l'entropie d'un processus  $(\mathcal{P}, T)$ , on peut maintenant introduire l'entropie du système dynamique  $(X, \mathcal{A}, \mu, T)$ .

**Définition 3.6** *L'entropie du système dynamique  $(X, \mathcal{A}, \mu, T)$ , notée  $E(T)$ , est définie par*

$$E(T) \stackrel{\text{déf}}{=} \sup_{\mathcal{P}} E(\mathcal{P}, T),$$

où le sup est pris sur toutes les partitions finies de  $X$ .

Par cette définition, il est clair que

$$0 \leq E(T) \leq +\infty,$$

et que  $E(T)$  est un invariant du système (si  $S$  est isomorphe à  $T$ , alors  $E(S) = E(T)$ ). Le théorème qui suit permet dans certains cas de calculer effectivement  $E(T)$ .

**Théorème 3.7 (Kolmogorov–Sinai)** *Si  $\mathcal{P}$  est une partition génératrice du système dynamique  $(X, \mathcal{A}, \mu, T)$ , alors*

$$E(T) = E(\mathcal{P}, T).$$

**Preuve** — Par définition de  $E(T)$ , on a toujours  $E(\mathcal{P}, T) \leq E(T)$ . Supposons  $\mathcal{P}$  génératrice, et prenons  $\varepsilon > 0$ . On peut trouver une partition  $\mathcal{Q}$  telle que  $E(\mathcal{Q}, T) > E(T) - \varepsilon/100$ . Puis, soit  $\delta > 0$  donné par la proposition 3.4 pour que  $|\mathcal{Q} - \bar{\mathcal{Q}}| < \delta$  entraîne  $|E(\mathcal{Q}, T) - E(\bar{\mathcal{Q}}, T)| < \varepsilon/100$ . Comme  $\mathcal{P}$  est génératrice, pour  $K$  assez grand on peut trouver une partition  $\bar{\mathcal{Q}} \subset \bigvee_{-K}^K T^i \mathcal{P}$ , avec  $|\mathcal{Q} - \bar{\mathcal{Q}}| < \delta$ . On a alors, en utilisant les propositions 3.5 et 3.3

$$E(\mathcal{P}, T) = E\left(\bigvee_{-K}^K T^i \mathcal{P}, T\right) \geq E(\bar{\mathcal{Q}}, T) \geq E(\mathcal{Q}, T) - \varepsilon/100 > E(T) - \varepsilon.$$

Comme  $\varepsilon$  est arbitraire, on a aussi  $E(\mathcal{P}, T) \geq E(T)$ . □

Comme application immédiate du théorème de Kolmogorov-Sinai, on peut maintenant calculer l'entropie d'un décalage de Bernoulli. Soit  $T$  le décalage de Bernoulli  $B(p_1, \dots, p_k)$ , défini sur l'espace  $X \stackrel{\text{déf}}{=} \{1, \dots, k\}^{\mathbb{Z}}$ . La partition  $\mathcal{P}$  de  $X$  définie par la coordonnée  $x_0$ , indexée par  $\{1, \dots, k\}$ , est ici génératrice. On a donc  $E(T) = E(\mathcal{P}, T)$ . De plus, les partitions  $T^j \mathcal{P}$ ,  $j \in \mathbb{Z}$  sont indépendantes, car la mesure considérée sur  $X$  est ici  $(p_1, \dots, p_k)^{\otimes \mathbb{Z}}$ . On a donc, par la proposition 3.2,

$$E(T) = E(\mathcal{P}, T) = E(\mathcal{P}) = -\sum_{i=1}^k p_i \log p_i.$$

**Corollaire 3.8** *Pour que les décalages de Bernoulli  $B(p_1, \dots, p_k)$  et  $B(q_1, \dots, q_l)$  soient isomorphes, il est nécessaire d'avoir*

$$\sum_{i=1}^k p_i \log p_i = \sum_{i=1}^l q_i \log q_i.$$

La question de savoir si cette condition est aussi suffisante est restée ouverte pendant une bonne dizaine d'années, jusqu'à ce que D.S. Ornstein prouve en 1970 [2] que deux décalages de Bernoulli de même entropie sont toujours isomorphes (pour un exposé complet de la théorie d'Ornstein, lire par exemple [3]).

**Exercice 3.1** Soit  $(X_p)_{p \in \mathbb{Z}}$  un processus de Markov stationnaire à valeurs dans un alphabet fini  $I$ , dont les probabilités de transition sont données par

$$P(X_0 = j | X_{-1} = i) = p_{i,j} \quad (i, j \in I).$$

Calculer l'entropie du système dynamique engendré par ce processus en fonction des  $p_{i,j}$  et des  $\mu_i \stackrel{\text{déf}}{=} P(X_0 = i)$  ( $i \in I$ ).

### 3.3 Un exemple de transformations d'entropie nulle

Rappelons que l'endomorphisme  $T$  de l'espace de Lebesgue  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  est dit *rigide* s'il existe une sous-suite d'entiers  $(j_n)_{n \geq 1}$  tendant vers  $+\infty$ , telle que pour tout  $A \in \mathcal{A}$ ,

$$\mu(A \Delta T^{-j_n} A) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0. \quad (3)$$

Un exemple simple de transformation rigide est donné par une rotation sur le cercle.

**Proposition 3.9** Si  $T$  est rigide, alors  $E(T) = 0$ .

**Preuve** — Il s'agit de montrer que pour toute partition  $\mathcal{P}$  de  $X$ ,  $E(\mathcal{P}, T) = 0$ . Soit donc  $\mathcal{P}$  une partition, et  $(j_n)_{n \geq 1}$  une suite de rigidité pour  $T$ . On voit facilement que

$$|\mathcal{P} - T^{j_n} \mathcal{P}| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

En utilisant la seconde partie de l'exercice 2.3, on en déduit que

$$E\left(\mathcal{P} \middle| \bigvee_1^n T^k \mathcal{P}\right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0,$$

d'où  $E(\mathcal{P}, T) = 0$ . □

### 3.4 Entropie d'un facteur de $T$

La démonstration de la proposition suivante est immédiate ; elle est laissée en exercice.

**Proposition 3.10** Si le système dynamique  $(Y, \mathcal{B}, \nu, S)$  est un facteur de  $(X, \mathcal{A}, \mu, T)$ , alors

$$E(S) \leq E(T).$$

Si  $\mathcal{F}$  est un facteur de  $T$  au sens d'une sous-tribu de  $\mathcal{A}$   $T$ -invariante, on définit l'entropie de ce facteur par

$$E(\mathcal{F}, T) \stackrel{\text{déf}}{=} \sup \{E(\mathcal{P}, T) \mid \mathcal{P} \text{ partitionn de } X \text{ } \mathcal{F}\text{-mesurable}\}.$$

On a de même

$$E(\mathcal{F}, T) \leq E(T).$$

### 3.5 Entropie des puissances de $T$

**Proposition 3.11** Soit  $T$  un automorphisme de  $(X, \mathcal{A}, \mu)$ , et  $p \in \mathbb{Z}$ . Alors

$$E(T^p) = |p| E(T).$$

**Preuve** — Montrons d'abord que  $E(T^{-1}) = E(T)$ . Pour cela, il suffit de remarquer que pour toute partition  $\mathcal{P}$ ,

$$E(\mathcal{P}, T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} E \left( \bigvee_{k=0}^{n-1} T^k \mathcal{P} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} E \left( \bigvee_{k=0}^{n-1} T^{-k} \mathcal{P} \right) = E(\mathcal{P}, T^{-1}).$$

On peut ensuite supposer  $p > 0$ . (Pour  $p = 0$ , c'est évident.) Soit  $\mathcal{P}$  une partition de  $X$ , et soit  $\mathcal{Q} \stackrel{\text{d\u00e9f}}{=} \bigvee_{k=0}^{p-1} T^k \mathcal{P}$ .

$$\begin{aligned} E(\mathcal{Q}, T^p) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} E \left( \bigvee_{k=0}^{n-1} T^{pk} \mathcal{Q} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p}{np} E \left( \bigvee_{k=0}^{np-1} T^k \mathcal{P} \right) \\ &= p E(\mathcal{P}, T). \end{aligned}$$

Puis

$$\begin{aligned} E(T^p) &= \sup_{\mathcal{P}} E(\mathcal{P}, T^p) \\ &= \sup_{\mathcal{P}} E \left( \bigvee_{k=0}^{p-1} T^k \mathcal{P}, T^p \right) \\ &= p \sup_{\mathcal{P}} E(\mathcal{P}, T) \\ &= p E(T). \end{aligned}$$

□

### 3.6 Entropie d'un produit

**Proposition 3.12** Soit  $T$  un automorphisme de  $(X, \mathcal{A}, \mu)$ , et  $S$  un automorphisme de  $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ . Sur  $(X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}, \mu \otimes \nu)$ , on considère l'automorphisme produit  $T \times S$ . Alors

$$E(T \times S) = E(T) + E(S).$$

**Preuve** — [...]

### 3.7 Entropie d'une transformation induite

**Proposition 3.13 (Formule d'Abramov)** Soit  $T$  un automorphisme de  $(X, \mathcal{A}, \mu)$ , et  $A \in \mathcal{A}$  une partie de  $X$  de mesure strictement positive. On désigne par  $T_A$  l'automorphisme de l'espace de Lebesgue  $(A, \mathcal{A}_A, \mu_A)$  induit par  $T$  sur  $A$ . Alors

$$E(T_A) = \frac{1}{\mu(A)} E(T).$$

**Preuve** — [...]

## 4 Facteur de Pinsker d'un automorphisme

Si  $A$  est une partie mesurable de  $X$ ,  $\mathbb{1}_A$  peut être vu comme une partition de  $X$  (au sens défini précédemment), indexée par  $\{0, 1\}$ , et dont les atomes sont  $A$  et  $A^c$ .

### 4.1 Définition du facteur de Pinsker

**Proposition 4.1** *Soit  $T$  un automorphisme de  $(X, \mathcal{A}, \mu)$ . Alors*

$$\Pi(T) \stackrel{\text{déf}}{=} \{A \in \mathcal{A} / E(\mathbb{1}_A, T) = 0\}$$

*est une sous-tribu  $T$ -invariante, appelée facteur de Pinsker de  $T$ . C'est le plus grand facteur d'entropie nulle de  $T$ .*

**Preuve** — Clairement,  $\Pi(T)$  contient  $X$  et  $\emptyset$ , et est stable par passage au complémentaire. Vérifions la stabilité de  $\Pi(T)$  par réunion finie. Prenons  $A$  et  $B$  dans  $\Pi(T)$ . On a alors

$$E(\mathbb{1}_A \vee \mathbb{1}_B, T) \leq E(\mathbb{1}_A, T) + E(\mathbb{1}_B, T) = 0.$$

Mais la partition  $\mathbb{1}_{A \cup B}$  est moins fine que  $\mathbb{1}_A \vee \mathbb{1}_B$ . On a donc

$$E(\mathbb{1}_{A \cup B}, T) \leq E(\mathbb{1}_A \vee \mathbb{1}_B, T) = 0,$$

d'où  $A \cup B \in \Pi(T)$ .

Il reste maintenant à vérifier la stabilité de  $\Pi(T)$  par limite croissante. Soit  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite croissante d'éléments de  $\Pi(T)$ , et  $A \stackrel{\text{déf}}{=} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ . On a

$$|\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_{A_n}| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0,$$

et donc par continuité de  $\mathcal{P} \mapsto E(\mathcal{P}, T)$ ,

$$E(\mathbb{1}_A, T) = \lim_{n \rightarrow \infty} E(\mathbb{1}_{A_n}, T) = 0,$$

et donc  $A \in \Pi(T)$ . Ainsi,  $\Pi(T)$  est bien une sous-tribu de  $\mathcal{A}$ . On vérifie immédiatement que  $\Pi(T)$  est  $T$ -invariante, et donc  $\Pi(T)$  est un facteur de  $T$ . Enfin, il est tout aussi facile de voir que  $\Pi(T)$  est le plus grand facteur d'entropie nulle de  $T$ .  $\square$

### 4.2 Passé lointain d'une partition

**Définition 4.2** *Soit  $\mathcal{P}$  une partition de  $X$ . On appelle passé lointain de  $\mathcal{P}$  la sous-tribu de  $\mathcal{A}$  notée  $\Pi(\mathcal{P}, T)$  définie par*

$$\Pi(\mathcal{P}, T) \stackrel{\text{déf}}{=} \bigcap_{n \geq 1} \bigvee_{k=n}^{+\infty} T^k \mathcal{P}.$$

Il est facile de voir que  $\Pi(\mathcal{P}, T)$  est encore un facteur de  $T$ . On souhaite maintenant établir que ce facteur est d'entropie nulle, et donc inclus dans  $\Pi(T)$ . Pour cela, on aura besoin du lemme suivant.

**Lemme 4.3** Soient  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  deux partitions de  $X$ . Alors

$$\begin{aligned} E(\mathcal{P}, T) &\stackrel{\text{d\u00e9f}}{=} E\left(\mathcal{P} \left| \bigvee_{k \geq 1} T^k \mathcal{P} \right.\right) \\ &= E\left(\mathcal{P} \left| \bigvee_{k \geq 1} T^k \mathcal{P} \vee \Pi(\mathcal{Q}, T) \right.\right). \end{aligned}$$

**Preuve** — On v\u00e9rifie ais\u00e9ment par r\u00e9currence que pour toute partition  $\mathcal{R}$ , et tout entier  $n \geq 1$ , on a

$$E\left(\bigvee_0^{n-1} T^{-j} \mathcal{R} \left| \bigvee_{k \geq 1} T^k \mathcal{R} \right.\right) = n E(\mathcal{R}, T). \quad (4)$$

On applique (4) avec  $\mathcal{R} \stackrel{\text{d\u00e9f}}{=} \mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$ . On obtient

$$\begin{aligned} E(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}, T) &= \underbrace{\frac{1}{n} E\left(\bigvee_0^{n-1} T^{-j} (\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) \left| \bigvee_{k \geq 1} T^k (\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) \right.\right)}_{A_n} \\ &\leq \underbrace{\frac{1}{n} E\left(\bigvee_0^{n-1} T^{-j} (\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) \left| \bigvee_{k \geq 1} T^k \mathcal{P} \right.\right)}_{B_n} \\ &\leq \frac{1}{n} E\left(\bigvee_0^{n-1} T^{-j} (\mathcal{P} \vee \mathcal{Q})\right) \\ &\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} E(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}, T). \end{aligned}$$

On en d\u00e9duit que  $A_n$  et  $B_n$  ont m\u00eame limite quand  $n \rightarrow \infty$ . On peut ensuite \u00e9crire

$$A_n = \underbrace{\frac{1}{n} E\left(\bigvee_0^{n-1} T^{-j} \mathcal{P} \left| \bigvee_{k \geq 1} T^k (\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) \right.\right)}_{A'_n} + \underbrace{\frac{1}{n} E\left(\bigvee_0^{n-1} T^{-j} \mathcal{Q} \left| \bigvee_{k \geq 1} T^k \mathcal{Q} \vee \bigvee_{-(n-1)}^{+\infty} T^k \mathcal{P} \right.\right)}_{A''_n},$$

et

$$B_n = \underbrace{\frac{1}{n} E\left(\bigvee_0^{n-1} T^{-j} \mathcal{P} \left| \bigvee_{k \geq 1} T^k \mathcal{P} \right.\right)}_{B'_n} + \underbrace{\frac{1}{n} E\left(\bigvee_0^{n-1} T^{-j} \mathcal{Q} \left| \bigvee_{-(n-1)}^{+\infty} T^k \mathcal{P} \right.\right)}_{B''_n}.$$

On a toujours  $A'_n \leq B'_n$ , et  $A''_n \leq B''_n$ . Forcément,  $A'_n$  et  $B'_n$  ont donc aussi même limite. Mais  $B'_n$  est toujours égal à  $E(\mathcal{P}, T)$ . Ainsi,

$$\begin{aligned}
E(\mathcal{P}, T) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} E \left( \bigvee_0^{n-1} T^{-j} \mathcal{P} \left| \bigvee_{k \geq 1} T^k (\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) \right. \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} E \left( T^{-j} \mathcal{P} \left| \bigvee_{k \geq 1} T^k \mathcal{Q} \vee \bigvee_{-(j-1)}^{+\infty} T^k \mathcal{P} \right. \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} E \left( \mathcal{P} \left| \bigvee_{k \geq j+1} T^k \mathcal{Q} \vee \bigvee_1^{+\infty} T^k \mathcal{P} \right. \right) \\
&= \lim_{j \rightarrow \infty} E \left( \mathcal{P} \left| \bigvee_1^{+\infty} T^k \mathcal{P} \vee \bigvee_{k \geq j+1} T^k \mathcal{Q} \right. \right) \\
&\leq E \left( \mathcal{P} \left| \bigvee_1^{+\infty} T^k \mathcal{P} \vee \Pi(\mathcal{Q}, T) \right. \right).
\end{aligned}$$

L'autre inégalité

$$E \left( \mathcal{P} \left| \bigvee_1^{+\infty} T^k \mathcal{P} \vee \Pi(\mathcal{Q}, T) \right. \right) \leq E(\mathcal{P}, T)$$

étant évidente, le lemme est démontré.  $\square$

On peut maintenant prouver que pour toute partition  $\mathcal{Q}$ ,  $\Pi(\mathcal{Q}, T) \subset \Pi(T)$ . En effet, prenons  $A$  dans  $\Pi(\mathcal{Q}, T)$ , et soit  $\mathcal{P} \stackrel{\text{d\u00e9f}}{=} \mathbb{1}_A$ . D'apr\u00e8s le lemme pr\u00e9c\u00e9dent, on a

$$E(\mathcal{P}, T) = E \left( \mathcal{P} \left| \bigvee_1^{+\infty} T^k \mathcal{P} \vee \Pi(\mathcal{Q}, T) \right. \right) = 0$$

car  $\mathcal{P}$  est  $\Pi(\mathcal{Q}, T)$ -mesurable. Ce qui prouve que  $A \in \Pi(T)$ . On a donc le r\u00e9sultat suivant.

**Proposition 4.4** *Pour toute partition  $\mathcal{Q}$ , on a*

$$\Pi(\mathcal{Q}, T) \subset \Pi(T).$$

**Proposition 4.5** *Soient  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  deux partitions telles que  $\mathcal{Q}$  soit  $\bigvee_{-\infty}^{+\infty} T^k \mathcal{P}$ -mesurable. Alors*

$$\Pi(\mathcal{Q}, T) \subset \Pi(\mathcal{P}, T).$$

**Preuve** — [...]

**Corollaire 4.6** *Si  $\mathcal{P}$  est une partition g\u00e9n\u00e9ratrice du syst\u00e8me, alors*

$$\Pi(T) = \Pi(\mathcal{P}, T).$$

### 4.3 $K$ -systèmes

On note ici  $\mathcal{T}$  la sous-tribu triviale de  $\mathcal{A}$ , c'est-à-dire l'ensemble des parties mesurables de  $X$  de probabilité 0 ou 1.

**Définition 4.7** *On dit que le système dynamique  $(X, \mathcal{A}, \mu, T)$  est un  $K$ -système si le facteur de Pinsker  $\Pi(T)$  est réduit à  $\mathcal{T}$ .*

Autrement dit,  $T$  est un  $K$ -système si  $E(\mathcal{P}, T) > 0$  pour toute partition  $\mathcal{P}$  non triviale de  $X$ , ou encore si le seul facteur d'entropie nulle de  $T$  est le facteur trivial. On dit aussi dans ce cas que  $T$  est d'entropie totalement positive.

**Théorème 4.8** *Les trois propriétés suivantes sont équivalentes.*

1.  $T$  est un  $K$ -système.
2. Pour toute partition  $\mathcal{P}$  de  $X$ ,  $\Pi(\mathcal{P}, T) = \mathcal{T}$ .
3. Pour tout  $A \in \mathcal{A}$ , et toute partition  $\mathcal{P}$ ,

$$\sup_{B \in \bigvee_n^{+\infty} T^k \mathcal{P}} \left| \mu(A \cap B) - \mu(A)\mu(B) \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Remarquons que la propriété 3 est plus forte que la propriété de mélange : elle impose une certaine uniformité dans la convergence de  $\mu(T^n B \cap A)$  vers  $\mu(B)\mu(A)$ . Les transformations vérifiant cette propriété sont dites  $K$ -mélangeantes.

**Preuve** —

- 1  $\implies$  2 se déduit immédiatement de la proposition 4.4.
- 2  $\implies$  1. Soit  $\mathcal{P}$  une partition telle que  $E(\mathcal{P}, T) = 0$ . On a donc

$$E \left( \mathcal{P} \left| \bigvee_{k \geq 1} T^k \mathcal{P} \right. \right) = 0,$$

et donc  $\mathcal{P}$  est  $\bigvee_{k \geq 1} T^k \mathcal{P}$ -mesurable. On voit alors facilement par récurrence que pour tout  $n \geq 1$ ,  $\mathcal{P}$  est  $\bigvee_{k \geq n} T^k \mathcal{P}$ -mesurable, et donc  $\mathcal{P}$  est  $\Pi(\mathcal{P}, T)$ -mesurable. Si on suppose 2,  $\Pi(\mathcal{P}, T) = \mathcal{T}$  et donc  $\mathcal{P}$  ne peut être que la tribu triviale.

2  $\implies$  3. Soit  $A \in \mathcal{A}$ , et  $\mathcal{P}$  une partition de  $X$ . Pour  $n \geq 1$ , soit  $\mathcal{B}_n \stackrel{\text{déf}}{=} \bigvee_{k \geq n} T^k \mathcal{P}$ , et  $\mathcal{B}_\infty \stackrel{\text{déf}}{=} \bigcap_{n \geq 1} \mathcal{B}_n = \Pi(\mathcal{P}, T)$ . En supposant 2,  $\mathcal{B}_\infty$  est donc la tribu triviale  $\mathcal{T}$ . Par un théorème classique de convergence de martingale, on a alors

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_A | \mathcal{B}_n] \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{L^1} \mathbb{E}[\mathbb{1}_A | \mathcal{B}_\infty] = \mu(A).$$

Soit maintenant  $n \geq 1$ . Pour tout  $B \in \mathcal{B}_n$ , on a

$$\begin{aligned} \left| \mu(A \cap B) - \mu(A)\mu(B) \right| &= \left| \int_X (\mathbb{1}_A - \mu(A)) \mathbb{1}_B d\mu \right| \\ &= \left| \int_B (\mathbb{E}[\mathbb{1}_A | \mathcal{B}_n] - \mu(A)) d\mu \right| \\ &\leq \int_X \left| \mathbb{E}[\mathbb{1}_A | \mathcal{B}_n] - \mu(A) \right| d\mu \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0. \end{aligned}$$

3  $\implies$  2. Soit  $\mathcal{P}$  une partition, et  $A \in \Pi(\mathcal{P}, T)$ . On a donc  $A \in \bigvee_{k \geq n} T^k \mathcal{P}$  pour tout  $n \geq 1$ , et donc en supposant 3,

$$\left| \mu(A) - \mu(A)^2 \right| \leq \sup_{B \in \bigvee_n^{+\infty} T^k \mathcal{P}} \left| \mu(A \cap B) - \mu(A)\mu(B) \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

On a donc  $\mu(A) = \mu(A)^2$ , i.e.  $\mu(A) = 0$  ou 1. D'où  $\Pi(\mathcal{P}, T) = \mathcal{I}$ . □

**Proposition 4.9** *Les décalages de Bernoulli sont des  $K$ -systèmes.*

**Preuve** — Si  $(X, \mathcal{A}, \mu, T)$  est un décalage de Bernoulli, il existe une partition  $\mathcal{P}$  génératrice telle que les partitions  $T^k \mathcal{P}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , soient indépendantes. On a alors par le corollaire 4.6

$$\Pi(T) = \Pi(\mathcal{P}, T).$$

Mais la loi du 0-1 de Kolmogorov prouve dans ce cas que  $\Pi(\mathcal{P}, T)$  est la tribu triviale, et donc  $\Pi(T) = \mathcal{I}$ . □

La réciproque n'est pas vraie : il existe une multitude d'exemples de  $K$ -systèmes non Bernoulli. Le plus simple à décrire est le système couramment désigné par " $T, T^{-1}$ " [...] (voir [1]).

## Références

- [1] S.A. KALIKOW,  $T, T^{-1}$  transformation is not loosely bernoulli, *Annals of Math.* **115** (1982), 393–409.
- [2] D.S. ORNSTEIN, *Bernoulli shifts with the same entropy are isomorphic*, *Advances in Math.* **4** (1970), 337–352.
- [3] ———, *Ergodic theory, randomness and dynamical systems*, Yale Univ. Press, New Haven, 1974.